

Naabak 4,9%

Acide N-acétyl aspartyl glutamique sodique
COLLYRE EN SOLUTION - SANS CONSERVATEUR

**LE CONCEPT ABAK® PERMET
D'INSTILLER DES GOUTTES SANS
CONSERVATEUR.**

COMPOSITION :

Acide N-acétyl aspartyl glutamique
sodique 4,9 g pour 100 ml.
Excipients : hydroxyde de sodium
ou acide chlorhydrique, eau pour
préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE :

Collyre en solution.

**CLASSE PHARMACO-
THERAPEUTIQUE :**

ANTI-ALLERGIQUE OCULAIRE
(S = organe des sens).

**TITULAIRE / EXPLOITANT /
DETENTEUR DE LA DECISION**

**D'ENREGISTREMENT :
LABORATOIRES THÉA**

12, rue Louis-Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
FRANCE.

**FABRICANT :
EXCELVISION**

Rue de la Lombardière
07100 Annonay – France

**DANS QUEL(S) CAS UTILISER
CE MEDICAMENT (INDICATIONS
THERAPEUTIQUES) ?**

Ce médicament est préconisé pour
soulager les symptômes oculaires
d'origine allergique (conjonctivites,
blépharoconjonctivites).

ATTENTION !

**DANS QUEL(S) CAS NE PAS
UTILISER CE MÉDICAMENT
(CONTRE-INDICATIONS) :**

**EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDISPENSABLE DE DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.**

Pour une bonne utilisation du collyre,
certaines précautions doivent être
prises :

- Se laver soigneusement les mains
avant de procéder à l'application,
- Ne pas toucher l'oeil ou les
paupières avec l'embout du flacon.

Instiller une goutte de collyre dans
le cul de sac conjonctival, en tirant
légèrement la paupière inférieure et
en regardant vers le haut. Le temps
d'apparition d'une goutte est plus long
qu'avec un flacon de collyre classique.
Reboucher le flacon après utilisation.

**FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL
LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE
ADMINISTRÉ :**

En moyenne, 2 à 6 fois par jour.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Après amélioration de la
symptomatologie, le traitement
doit être poursuivi pendant toute la
période de risque d'allergie.

**EFFETS NON SOUHAITÉS ET
GÉNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES) :**

Possibilité de sensations brèves
de brûlures ou de picotements au
moment de l'instillation.

**SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À
VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET
NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI
NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS
CETTE NOTICE.**

CONSERVATION :

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA
VUE DES ENFANTS.**

**NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE
D'UTILISATION FIGURANT SUR LE
CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.**

**PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE
CONSERVATION :**

A conserver à une température

- L'absence de conservateur dans les gouttes instillées autorise le port de lentilles souples.

- Ne pas toucher l'oeil avec l'embout du flacon.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez l'enfant de moins de 4 ans, **NE PAS UTILISER SANS AVIS**

MÉDICAL.

- En cas d'allergie conjonctivale sévère, **CONSULTER VOTRE MÉDECIN.**

- Ne pas dépasser la posologie prescrite ou conseillée, ne pas interrompre votre traitement sans avis médical.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTÉRACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTÉRACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE : 1 goutte, 2 à 6 fois par jour.

Mode et voie d'administration :
Voie locale - EN INSTILLATION OCULAIRE.

ne doit pas être conservé au delà de 8 semaines après la première ouverture.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Juin 2006.

INFORMATION CONSERVATEURS

Un collyre est une solution destinée à l'instillation oculaire.

Cette solution doit rester stérile pour éviter toute contamination microbienne de l'oeil.

Afin d'assurer cette stérilité, la plupart des collyres en flacon contiennent un agent antimicrobien appelé agent conservateur.

Ces agents peuvent être responsables de réactions allergiques et / ou toxiques au niveau de la surface oculaire et du film lacrymal, pouvant se manifester par des picotements, brûlures ou larmoiements, plus généralement, des sensations d'inconfort. Cette intolérance est majorée lors d'une utilisation prolongée du collyre, comme c'est le cas lors d'un traitement chronique tel que l'allergie.

Le concept **ABAK®** permet d'instiller des gouttes sans conservateur.

N° DE Algérie : 09/17B 100/022

Enreg TN : n° 8443022

Enreg MA :

n° 362/12 DMP/21/NRQ

 **Théa**

12, rue Louis-Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
FRANCE

ET 20X/2AM01/22/2M