Ibuprofène BEKER®

Ibuprofène

Comprimé pelliculé 600 mg

1-FORME ET PRESENTATION:
Ibuprofène BEKER® 600 mg: Comprimé pelliculé. Boite de 20 comprimés.

2-COMPOSITION:
Chaque comprimé pelliculé contient:
Ibuprofène ..... 600 mg.

Excipients:
Amidon de maïs, acide stéarique, silice colloïdale, glycolate d'amidon sodique, stéarate de magnésium, povidone, amidon de maïs prégélatinisé.

Agent d'enrobage:
Alcool polyvinylique,poly éthylène glycol, talc , dioxyde de titane ,oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, oxyde de fer noir

3-CLASSE THERAPEUTIQUE:
Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien, il appartient à la classe des AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES.

4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES:
Ibuprofène BEKER® 600 mg est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de 12 à 14 ans pour : la polyarthrite juvénile (enfants), arthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante, chirurgie stomatologique et obstetrique et traumatologie.

5-POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:
Posologie:
ADAPTE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE (12-14 ans)

Adulte:
• En rhumatologie, la dose d'attaque recommandée est de 1800 mg (3 Cps à 600 mg) et une dose d'entretien de 1200 mg (3 Cps à 400 mg ou 2 Cps à 600 mg).
• En cas d'arthrite rhumatoïde et de spondylite ankylosante, la dose peut être de 2400 mg par jour (4 Cps à 600 mg).
Chirurgie, stomatologie et obstétrique:
• Dans les cas de douleurs suite à des interventions chirurgicales, obstétriques, stomatologiques et dentaires, il y a lieu de prendre 800 à 1200 mg par jour (3 Cps à 400 mg ou 2 Cps à 600 mg).
• En gynécologie, en cas de dysménorrhée, il est conseillé de prendre 1200 mg par jour en doses fractionnées. Le traitement doit commencer dès que la douleur s'annonce ou même le jour précédent; deux à trois jours de traitement suffisent en général.
• En traumatologie, suivant la gravité, une dose de départ de 3 000 mg par jour (2 Cps à 600 mg le matin, 1 Cp à 600 mg le midi et 2 Cps à 600 mg le soir) ou de 2 400 mg (1 Cp à 600 mg le matin et le midi et 2 Cps à 600 mg le soir) et ce durant quelques jours. Ensuite, réduire progressivement cette dose à 1 800 mg par jour (3 Cps à 600 mg) jusqu'à une dose d'entretien de 1200 mg par jour (3 Cps à 400 mg ou 2 Cps à 600 mg).

Enfants:
Ibuprofène BEKER® 600 mg ne sera pas administré à des enfants en dessous de 12 ans, excepté dans des affections telles que la polyarthrite juvénile (syndrome de Still). On utilise alors une dose journalière voisine de 20 à 40 mg/kg de poids corporel, à prendre en 3 fois par jour.
Suivant l'âge la posologie sera de:
- 7 à 11 ans : maximum 1200 mg par jour (3 Cps à 400 mg)
- 12 à 14 ans : maximum 1800 mg par jour (3 Cps à 600 mg)

Sujet âgé:
Le sujet âgé présentant un risque accru d'effets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d'administration:
Voie orale.
Avaler le comprimé, sans le croquer, avec un grand verre d'eau.
Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Fréquence d'administration:
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.
Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures
La durée d'utilisation est limitée à 3 jours en cas de fièvre et 5 jours en cas de douleurs.
Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un autre trouble, en informer votre médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DU MEDECIN.

6-CONTRE-INDICATIONS:
Ne prenez jamais **Ibuprofène BEKER®**, les cas suivants:
• Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
• Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
• Antécédent d'allergie aux autres constituants du comprimé,
• Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
• Ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,
• Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
• Maladie grave du foie,
• Déférasirox
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Lupus érythémateux disséminé,
L'Ibuprofène BEKER® est également contre-indiqué pour les enfants âgés de moins de 12 ans (sauf en cas d'arthrite rhumatoïde juvénile).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7-MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:
Mises en garde spéciales:
Si vous êtes une femme, **Ibuprofène BEKER®**, peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des difficultés pour procréer ou chez lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **Ibuprofène BEKER®**.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:
D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce produit peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien.
• De troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,
• D'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
• De maladie du cœur, du foie ou du rein,
• De varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,
• De traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par exemple : autres AINS, des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre **Ibuprofène BEKER®**
• De traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed.
AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:
• De troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,
• D'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,
• D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à des brûlures (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,
• De signes évocateurs d'une allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.
• Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens(y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).
• Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens(y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).
Précautions d'emploi:
La survenue d'effets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels qu'**Ibuprofène BEKER®**, pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien
- En cas de troubles de la vue (qui apparaissent au cours du traitement), un examen ophtalmologique complet doit être effectué.
- Au cours de traitement prolongé, il est recommandé de contrôler la formule sanguine, les fonctions hépatiques et rénales.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8-INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS:
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Notamment:
•Aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens
• Corticostéroïdes
• Anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlopidine
• Lithium
• Méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg/semaine
• Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêtabloquants (sauf esmolol) et antagonistes de l'angiotensine II
• Certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)
• Pemetrexed
• Ciclosporine, tacrolimus.
• Déférasirox

9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT:
Grossesse:
Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement:
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

10-CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES:
L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

11-EFFETS INDESIRABLES:
Comme tous les médicaments, **Ibuprofène BEKER®** est susceptible d'induire des effets indésirables chez certaines personnes plus ou moins gênants:
- Les médicaments tels qu'**Ibuprofène BEKER®**, pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral.
Peuvent survenir des réactions allergiques:
• Cutanées: éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique,
• Respiratoires : de type crise d'asthme,
• Générales: brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke).
Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale. Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.
Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque.
Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.
Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations).

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:
• Des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, flatulence, constipation, ulcération digestive.
• Exceptionnellement vertiges, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des urines, insuffisance rénale.

Dans tous les cas, il faut en avertir votre médecin.

• Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse des globules blancs ou des globules rouges) pouvant être graves, cas de diabète.
La découverte d'une méningite aseptique sous ibuprofène doit faire rechercher un lupus érythémateux disséminé ou une connectivite.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

12-SURDOSAGE:
En cas de surdosage accidentel ou d'intoxication, arrêtez le traitement et consultez rapidement un médecin.

13-OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES:
Si vous avez oublié de prendre **Ibuprofène BEKER®**, Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

14-CONSERVATION:
A conserver dans l'emballage externe d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.

Liste II

DE n°: 15 / 04 B 044 / 447.

Détenteur de la DE:
Laboratoires Beker
BEKER LABORATOIRES
Cité Aissat Idir, Dar el Beida 16100, Alger.
Fabricant/Conditionneur:
Laboratoires Beker - Algérie
Z.A, extension Dar El Beida, cité Fatma N'Soumer
N°18 Dar el Beida 16100, Alger.

Date de dernière mise à jour : **Avril 2016.**

IBU 600 / N-02

ايبوبروفين بيكر

ايبوبروفين
قرص مغلف 600 مغ

1-الشكل و التقديم:
ايبوبروفين بيكر® 600 مغ: أقراص مغلفة. علبة ذات 20 قرص.

2-التركيب:
يحتوي كل قرص مغلف على:
ايبوبروفين بيكر® 600 مغ:
ايبوبروفين ..... 600 مغ.

السواغات:
نشاء الذرة، خمْضُ الستياريك، سيليس غَرَوانِيّ، غليكولات النشاء الصودي، ستيارات المغنيزيوم، بوفيدون، نشاء الذرة سابق الهُلمَنة.

الغلاف:
كحول متعدد الفينيل، متعدد الاثيلان غليكول، تلك، ثنائي اكسيد التيتان، أكسيد الحديد الأحمر، أكسيد الحديد الأصفر، أكسيد الحديد الأسود.

3-الصنف العلاجي:
هذا الدواء يحتوي على مضاد للالتهاب غير ستيرويدي ينتمي إلى مرتبة المُنشِّطات و مُضادَّات الحُمّى.

4-دواعي الاستعمال:
ايبوبروفين بيكر® 600 مغ يوصف عند الراشد و للطفل من 12 الى 14 سنة لعلاج: اِلْتِهابُ المَفاصِلِ الشامِلِ اليَفَعِيّ (الاطفال)، اِلْتِهابُ المَفاصِلِ الروماتويدي و اِلْتِهابُ الفَقارِ الرُّوماتويديّ، يمكن زيادة الجرعة الى 2400 مغ في اليوم (4 اقراص 600 مغ)
الجراحة، طبُّ الفم و طبُّ التُّوليد:
• في حالة الآلام الناتجة الناتجة عن عمليات جراحية، الولادة، آلام الفم و الاسنان، يجب اخذ من 800 الى 1200 مغ في اليوم (3 اقراص من 400 مغ او قرصين من 600 مغ).
• في طبِّ النِّساء، عَسْرُ الطَّمْث، ينصح بأخذ 1200 مغ في اليوم في جرعات مجزأة. يجب البدء في العلاج حالما يظهر الألم او من قبل بيوم، العلاج لمدة يومين او ثلاثة يكون كاف في أغلب الاحيان.
• في طبِّ الرُّضوح، حسب الخطورة، الجرعة في البداية تكون 3000 مغ في اليوم (قرصين من 600 مغ في الصباح، قرص من 600 مغ في منتصف النهار و قرصين من 600 مغ في المساء) او 2400 مغ (قرص من 600 مغ في الصباح و في منتصف النهار و قرصين من 600 مغ في المساء) و هذا لبضعة ايام. ثم يتم تخفيض هذه الجرعة تدريجيا الى 1800 مغ في اليوم (3 اقراص من 600 مغ) حتى جُرْعَةُ المُداوَمَة 1200 مغ في اليوم (3 اقراص من 400 مغ او قرصين من 600 مغ).
الاطفال:
ايبوبروفين بيكر® 600 مغ لا يؤخذ عند الاطفال دون سن 12 سنة، الا في حالات الاصابات مثل اِلْتِهابُ المَفاصِلِ الشّامِلِ اليَفَعِيّ (مُتَلازِمَة ستل). تستعمل في هذه الحالة جرعة يومية مجاورة لـ 20 الى 40 مغ/كغ في اليوم من الوزن الجسدي، تؤخذ ثلاث مرات في اليوم.
حسب السن تكون الجرعة كما يلي:
- من 7 الى 11 سنة: الجرعة القصوى 1200 مغ في اليوم (قرصين من 600 مغ).
- من 12 الى 14 سنة: الجرعة القصوى 1800 مغ في اليوم (3 اقراص من 600 مغ).
الشخص المسن:
الشخص المسن معرض اكثر لخطر آثار غير المرغوبة، يجب استعمال اضعف جرعة ممكنة لأقصر فترة ضرورية لتخفيف الاعراض.

في حالة الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

طريقة الاستعمال:
عن طريق الفم
ابتلع القرص، دون مضغه، مع كأس كبير من الماء
يستحسن أخذ الاقراص أثناء وجبة الطعام.
ثوائرُ الاستعمال:
أخذ الدواء بانتظام يسمح بتفادي تَذبذبات الالم أو الحمى.
يجب ان يكون الفارق الزمني بين الجرعات على الأقل 6 ساعات.
تحدد مدة العلاج بـ 3 ايام للحمى و 5 ايام للآلام.
ان استمر الألم أكثر من 5 ايام او الحمى اكثر من 3 ايام، او ان ازدادت خطورتهما او في حال ظهور اضطراب آخر، أعلم طبيبك بذلك.

احترموا دائما مقدار الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب.

6-موانع الاستعمال:
يمنع استخدام **ايبوبروفين بيكر®** في الحالات التالية:
• بعد الشهر الخامس من الحمل (24 أسبوع من انقطاع الحيض).
• سوابق حساسية أو ربو محفز بأخذ هذا الدواء او دواء آخر ذو صلة، خاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى، حمض الاستيتالسيليك (الأسبيرين).
• سوابق حساسية اتجاه مكونات القرص الاخرى.
• سوابق نزيف معدي - معوي او قرحة مرتبطة بعلاجات سابقة بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
• وجود قرحة او نزيف على مستوى المعدة او الامعاء في حالة تطور او تكرر.
• نزيف معدي - معوي،نَزِيفٌ دِماغِيّ أو في حالة وجود نزيف آخر حاليا.
• مرض خطير للكبد.
• مرض خطير للكلى.
• مرض خطير للقلب.
• دُنْيَةٌ حَمامِيَّةٌ مُنْتَشِرَة.
• يمنع كذلك اخذ **ايبوبروفين بيكر®** عند الطفل دون سن 12 سنوات إلا في حالة اِلْتِهابُ المَفاصِلِ الروماتويدي اليَفَعِيّ

في حالة الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

7-تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال:
تحذيرات خاصة:
ان كنت امرأة، فإن **ايبوبروفين بيكر®** قد يحدث خلل في خصوبتك. لا ينصح باستعماله للنساء اللواتي يردن الانجاب او اللواتي تجدن صعوبة للإنجاب او اللواتي تجرين فحوصات حول وظيفة الانجاب حاليا. ينبغي عليهن اعلام الطبيب أو الصيدلي قبل اخذ **ايبوبروفين بيكر®**
الاشخاص المسنون معرضون اكثر لخطر الآثار غير المرغوبة، خاصة للنزيف المعدي - المعوي، القرحة و الثقوب، الوظائف الكلوية، الكبدية و القلبية يجب مراقبتها بصرامة. يجب ان تكون الجرعة ضئيلة قدر الامكان خلال اقصر فترة لازمة لتخفيف الاعراض.
قبل استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك في حالة:
سوابق ربو مرتبط بِاِلْتِهابُ بِطانَةِ الأنْفِ المزمن، اِلْتِهابُ الجُيوبِ المزمن او مَليئَةٌ أنْفِيَّة. استعمال هذا الدواء قد تسبب بأزمة ربو، خاصة لدى الاشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حمض الاستيتالسيليك (الاسبيرين) او مضاد للالتهاب غير ستيرويدي.
• اضطرابات في التخثر، أخذ علاج مضاد للتخثر. هذا الدواء قد يؤدي الى ظواهر معدية - معوية خطيرة.
• سوابق اضطرابات هضمية (فتق الفرجة الحجابية، نزيف هضمي، قرحة المعدة او الإثناعَشَرِيّ فيما سبق).
• مرض القلب، الكبد أو الكلى.
• الحُماق، لا ينصح بهذا الدواء لوجود حالات استثنائية لعدوى خطيرة للجلد.
• العلاج في أن واحد بأدوية اخرى تزيد من خطر قرحة المَعِدَيُّ اِثْناعَشَرِيّ او النزيف، مثلا: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الاخرى، القشرانيات عن طريق الفم، مُضادَّات الاكْتِئاب (من نوع ISRS اي المثبطات الانْتِقائِيَّة لإلتقاط السيروتونين)، الادوية الواقية من تكوّن الجلطات الدموية مثل الاسبيرين او مضادات التخثر مثل الوارفارين. ان كنت في احد هذه الحالات، استشر الطبيب قبل الشروع في العلاج **بايبوبروفين بيكر®**
• العلاج في أن واحد بالميتوتريكسات بجرعات أكبر من 20 مغ للاسبوع او بالبيميتريكسد.
أثناء العلاج، في حالة:
• اضطرابات في الرؤية، يجب اعلام الطبيب.
• نزيف معدي - معوي (خروج الدم من الفم او في البراز، تلون البراز بالأسود).
يجب التوقف عن العلاج او التوجه الى الطبيب فور او الى مصلحة الاستعجالات.
• ظهور اشارات جلدية او مخاطية تشبه البثور (احمرار مع فُقّاعات، تَقَرُّحات) يجب التوقف عن العلاج او التوجه الى الطبيب فور او الى مصلحة الاستعجالات.
• اشارات توحي بحساسية لهذا الدواء، خاصة نوبات الربو او انتفاخ مفاجيء للوجه والرقبة. يجب التوقف عن العلاج او التوجه الى الطبيب فور او الى مصلحة الاستعجالات.
هذا الدواء عبارة عن مضاد للالتهاب غير ستيرويدي. لا يجوز أخذه في نفس الوقت مع أدوية أخرى تحتوي على مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بما فيها المثبطات الانتقائية للسيكلواوكسيجناز 2) و/او حمض الاستيتالسيليك (الاسبيرين). اقرأ بانتباه نشرات الادوية الاخرى التي تأخذها لتتأكد من عدم احتوائها على مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بما فيها المثبطات الانتقائية للسيكلواوكسيجناز 2) و/او حمض الاستيتالسيليك (الاسبيرين).

احتياطات الاستعمال:
من الممكن تخفيف ظهور الآثار غير المرغوبة باستعمال اضعف جرعة ممكنة خلال اقصر فترة ضرورية لتخفيف الاعراض.
في الجرعات الكبيرة، ما فوق 1200 مغ/اليوم، هذا الدواء لديه خصائص مضادة للالتهاب و قد يتسبب في تأثيرات غير مرغوبة تكون خطيرة في بعض الاحيان و هي نفسها الملحوظة مع الادوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية .
الادوية مثل **ايبوبروفين بيكر®** قد تزيد من خطر حدوث نوبة قلبية (اِحْتِشاءُ القَلْب) او حادثة وعائية قلبية. كلما كانت الجرعات المستعملة اكبر و مدة العلاج اطول يكون الخطر اكبر.
لا يجوز تجاوز الجرعات الموصوفة ولا مدة العلاج.
ان كنت تعاني من مشاكل قلبية، ان سبق و عانيت من حادثة وعائية قلبية او ان كنت تظن انه لديك عوامل خطر لهذا النوع من المرض (مثلا في حالة ضغط الدم المرتفع، داء السكري، نسبة الكولسترول المرتفعة و ان كنت تدخن). استشر طبيبك او الصيدلي.
- في حال وجود اضطرابات في الرؤية (التي تظهر اثناء فترة العلاج). يجب اجراء فحص شامل للعينين.
- في حالة العلاج الممتدّ، ينصح بمراقبة الصيغة الدموية، الوظائف الكبدية و الكلوية.

في حالة الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

8-التفاعلات مع أدوية أخرى:
لتجنب التفاعلات المحتملة مع أدوية أخرى، يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي دواء آخر قيد الاستعمال.
خاصة:
• الاسبيرين (حمض الاستيتالسيليك). او مضادات التهاب غيرستيرويدية اخرى.
• كورتيكوستيرويدات.
• مضادات التخثر التي تؤخذ عن طريق الفم مثل الوارفارين،هيبارينالخَفِّ،مضادات لتكدس الصفيحات،اومضادات الخَثْرَة مثل تيكلوبيدين.
• الليثيوم.
• الميتوتريكسات بجرعات أكبر من 20 مغ/للأسبوع.
• مثبطات انزيم التحول للانجيوتنسين، مدرات البول، مثبطات بيتا، مُناهِضَة الانجيوتنسين II.
• بعض مضادات الاكْتِئاب (مثبطات انتقائية لاعادة التقاط السيروتونين).
• بيميتريكسد
• سيكلوسبورين، تاكروليموس.
• دبفيرازيروكس

9-الحمل و الرضاعة:
الحمل:
خلال الفصل الاول من الحمل (12 اسبوع من إنْقِطاعُ الحَيْض اي 12 اسبوع بعد اول يوم من آخر دورة شهرية)، طبيبك قد يصف لكي هذا الدواء اذا لُزِم الامر.

من 2.5 الى 5 اشهرمن الحمل (12 الى 24 اسبوع من إنْقِطاعُ الحَيْض)، هذا الدواء لن يستعمل إلا بنصيحة من طبيبك و لفترة جد قصيرة.
ينصح بشدة عدم الاستعمال المطول لهذا الدواء.

ما بعد 5 اشهر من الحمل (بعد 24 اسبوع من إنْقِطاعُ الحَيْض)،
لا يجوز في اي حال من الاحوال استعمال هذا الدواء، لان تأثيره على طفلك قد تكون له نتائج خطيرة خاصة على المستوى القَلْبِيُّ الرِئَوِيّ و الكلوي، حتى لو اخذ لمرة واحدة.
ان أخذت هذا الدواء و أنت حامل لأكثر من خمسة اشهر، استشيري طبيب النساء والتَّوليد ليقترح عليك المراقبة اللازمة.

الرضاعة:
هذا الدواء ينتقل الى حليب الأم. من جانب الاحتياط، يجب تفادي استعماله خلال فترة الرضاعة.

بصفة عامة، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء أثناء الحمل و الرضاعة.

10-السائقين ومستعملي الآلات:
في حالات نادرة، اخذ هذا الدواء قد يؤدي الى دوار و اضطرابات في الرؤية.

11-الآثار غيرالمرغوبة:
مثل كل الادوية، **ايبوبروفين بيكر®** من المحتمل ان تكون له آثار غير مرغوبة اكثر او اقل ازعاجا:
الادوية مثل **ايبوبروفين بيكر®** قد تزيد من خطر النوبات القلبية (احتشاء القلب) اوالحوادث الوعائية الدماغيّة:
قد تظهر حساسية:
• جلدية: طفح جلدي، حكة، وَذمة، تفاقم الشرى المزمن.
• تنفسية: على شكل نوبات ربو.
• عامة: انتفاخ مفاجيء للوجه و الرقبة مع ازعاج تنفسي (وذمة كوينك).
في بعض الحالات النادرة، قد يحدث نزيف معدي - معوي. و يتكرر ذلك كلما كانت الجرعة المستعملة مرتفعة.
قد تلاحظ استثنائيا الام في الرأس مصحوبة بغثيان، قيء و رَقَبَةٌ مُتَيَبِّسَة.
استثنائيا، لوحظت عدوات خطيرة للجلد في حالة الحُماق.
في حالات جد استثنائية قد تظهر فقاعات جلدية و مخاطية (احساس بحرق مصحوب باحمرار و فقاعات، بثور و تقرّحات)

في جميع هذه الحالات، يجب التوقف عن العلاج فورا و اعلام الطبيب

أثناء العلاج من الممكن حدوث:
• اضطرابات هضمية: الام في المعدة، قيء، غثيان، اسهال، نفخ، امساك، تَقَرُّح هضمي.
• استثنائيا دوار، الام في الرأس، اضطرابات نادرة في الرؤية، نقص هام في كمية البول، قصور كلوي.

في جميع الحالات، يجب اعلام الطبيب

• استثنائيا، لوحظت تغيرات في الوظيفة الكبدية او تركيبة الدم (نقص في الكريات البيضاء او الحمراء) قد تكون خطيرة. حالة داء السكري.

أعلموا الطبيب أو الصيدلي عن أي اثر غير مرغوب فيه او مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

12-الجرعة الزائدة:
في حالة تجاوز الجرعة او التسمم العرضي، توقف عن العلاج و اعلم طبيبك فورا.

13-نسيان جرعة اوعدة جرعات:
ان نسيت تناول **ايبوبروفين بيكر®** لا تأخذ جرعة مُزْدَوِجة لتعويض الجرعة المنسية.

14-الحفظ:
يحفظ داخل العلبة الخارجية الاصلية، في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م.
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
لا يستعمل بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة

القائمة II

مقررالتسجيل رقم: 447 / 044 B / 04 / 15

صاحب مقرر التسجيل:
مخابر بيكر
BEKER LABORATOIRES
حي عيسات إيدير، الدار البيضاء 16100، الجزائر.
الصانع/المعبئ:
مخابر بيكر - الجزائر
م.ن. إضافة للدار البيضاء، حي فاطمة نسومر
رقم 18 الدار البيضاء 16100، الجزائر.

تاريخ مراجعة النّشرة: **أفريل 2016**.

IBU 600 / N-02